

Lanius excubitor

Especie que se consideraba invernante en el norte peninsular, y de la que se conocían solamente unas pocas citas anuales. Actualmente se considera rara y sus citas requieren homologación por parte del Comité de Rarezas de SEO. No se conoce ninguna fotografía de esta especie en la península ibérica, y ni tan solo se puede confirmar una sola cita fidedigna basada en una descripción. Confundida a menudo con algunos plumajes del Alcaudón Real (*Lanius meridionalis*), nidificante en la península. Si se consiguiera una imagen de este taxón en la península, sería la primera cita que podría homologarse para la ciencia. Actualmente, se está considerando la retirada de esta especie de la Lista de las Aves de España, por no conocerse ninguna cita bien documentada y que no ofrezca ninguna duda. Todas las fotos que se han analizado supuestamente referidas a *L. excubitor*, fueron definitivamente asignadas a *L. meridionalis*. De fácil confusión con el Alcaudón Real. La coloración muy pálida de algunos ejemplares de Alcaudón Real en invierno, o aves de primer invierno, junto a algunos desplazamientos estacionales, inducen a veces a pensar en la invernada de Alcaudones Norteños. El tamaño, la estructura, y longitud del pico y la cola no son caracteres determinantes para la distinción de estas especies, que si pueden diferenciarse por el plumaje. El Alcaudón Norteño presenta una coloración muy pálida, con contraste casi inexistente entre las partes dorsales y ventrales, a diferencia del Real, cuyo dorso es de un gris plumizo. Las condiciones de luz pueden influir notablemente en estas apreciaciones. En el Norteño, la máscara facial negra es mas pequeña, cuadrada, y poco extendida detrás del ojo. El tamaño de la mancha alar blanca en el ala plegada parece ser un buen carácter diagnóstico, siendo en el Alcaudón Norteño mas grande pero menos conspicua que en el Real.